



Organización Centro S.R.L.

MAYORISTA
DE SERVICIOS Y PRODUCCIÓN DE SEGUROS



☰ EMERGENCIA:

- Ahogo en agua o cuerpo extraño con serios trastornos respiratorios.
- Amputación traumática de dedos o extremidades.
- Convulsiones generalizadas con pérdida de la conciencia.
- Dificultad respiratoria severa de inicio brusco (Generalmente antecedentes bronquiales).
- Dolor de pecho de comienzo agudo en mayores de 35 años con factores de riesgo.
- Electrocuación con Pérdida de Conciencia.
- Fracturas Expuestas.
- Heridas Sangrantes Graves.
- Intoxicaciones por ingestión de tóxicos o inhalación de gases.
- Neurológicas en Miembros.
- Paro Cardiorrespiratorio.
- Quemaduras Profundas y Extensas (40% del cuerpo).
- Shock anafiláctico por reacción alérgica grave (Medicamento o alimento ingerido).
- Shock Hipoglucémico (Antecedentes de Diabéticos en tratamiento insulínico).
- Traumatismos Cervicales con Manifestaciones.
- Traumatismo Grave con Pérdida de Conocimiento o Trastornos del sensorio.

☰ URGENCIA:

- Accidente en vía pública.
- Cólicos de origen renal, intestinal o vesicular.
- Crisis de Asma.
- Crisis de excitación psíquica.
- Crisis de hipertensión arterial.
- Descompensación cardíaca.
- Fracturas no expuestas.
- Lipotimias por hipotensión.
- Mareos de inicio reciente.
- Vértigo.
- Quemaduras menores.
- Reacciones alérgicas sin compromiso respiratorio.
- Traumatismos no graves.
- Esguinces.

☰ CONSULTA MÉDICA:

- Cefalea intensa asociado con HTA.
- Conjuntivitis.
- Cuadro febril de inicio reciente.
- Cuerpo extraño en ojo, u ojo rojo doloroso.
- Diarrea sanguinolenta.
- Disnea leve asociada a fiebre, asociada a cuadros de angustia o asociada a hormigueos en mujeres c/antecedente simil.
- Disuria, lumbalgia, fiebre (más de 38°).
- Dolor abdominal tipo cólicos intensos con períodos sin dolor, dolor abdominal en fosa iliaca derecha.
- Dolor de tórax asociado a fiebre y/o tos, asociado a crisis de angustia. En menores de 30 años s/antec.
- Dolores abdominales tipo cólico.
- Embarazo con contracciones a intervalos mayores a 5 min.
- Episodios de Asma leves.
- Estados emocionales con ansiedad, pánico, etc.
- Fiebre antec convul. menos de 6 años.
- Heridas cortantes leves con abundante sangrado que sede con compresión.
- Heridas pequeñas sin sangrado importante.
- Hipertensión constatada leve s/antecedentes.
- Hipertensión no constatada, síntomas difusos como cefalea, mareos.
- Hipotensión arterial 200/100.
- Lipotimia recuperada s/antecedentes, ni síntomas posteriores.
- Mareos de más de dos horas de evolución.
- Palpitaciones en pacientes que no saben determinar el pulso o antecedentes de trastornos de ansiedad.
- Pequeñas quemaduras.
- Post convulsivo c/antecedentes.
- Quemaduras de menos del 9% del cuerpo.
- Reacciones alérgicas asociadas a dif. resp. leve.
- Sin síntomas de glucemia superior a 250 mg/dl.